

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Dehinel Plus Flavour tabletes suņiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovēnija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Francija
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Dehinel Plus Flavour tabletes suņiem

Praziquantel, pyrantel embonate, febantel

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra tablete satur:

Prazikvantels	50 mg
Pirantela embonāts	144 mg
Febantels	150 mg

Apaļas, dzeltenas krāsas neapvalkotas tabletes ar redzamiem tumšākas krāsas plankumiem un slīpām malām, ar krustenisku dalījuma līniju vienā pusē.
Tableti var sadalīt divās vai četrās vienādās daļās.

4. INDIKĀCIJAS

Suņiem un kucēniem jauktu nematožu un cestozu invāziju ārstēšanai, kuras ierosina sekojošas parazitū sugas:

Nematodes:

Cērmes: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (pieauguši parazitīti un nenobriedušu kāpuru formas vēlā stadijā)

Āķtārpi: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (pieauguši parazitīti)

Cestodes:

Lenteņi: *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietojiet vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem.
Nepārsniet noteiktās devas, lietojot grūsnām kucēm.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.
Nelietot suņiem, kas jaunāki par 2 nedēļām un/vai suņiem, kuru svars ir mazāks par 2 kg.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Retos gadījumos kucēniem var novērot šķidrūs izkārnījumus, caureju un/vai vemšanu. Pieaugušiem suņiem ļoti retos gadījumos var novērot vemšanu ar vai bez caurejas.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā);
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 no 10000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus gadījumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi (maza un vidēja izmēra).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Devas

Ieteicamā deva ir 15 mg/kg ķermeņa svara (ĶS) febantela, 14,4 mg/kg ĶS pirantela un 5 mg/kg ĶS prazikvantela. Tas atbilst 1 tabletei uz 10 kg ķermeņa svara.

Lai piemērotu devu, tableti var sadalīt divās vai četrās vienādās devās.

Tabletes var dot tieši sunim mutē vai piemaisīt barībai. Pirms vai pēc ārstēšanas badošanās nav nepieciešama.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai nodrošinātu pareizu devu lietošanu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Kucēnus vajadzētu attārpot, sākot no 2 nedēļu vecuma, un ik pēc 2 nedēļām līdz 12 nedēļu vecumam. Tādēļ tos ieteicams attārpot ar 3 mēnešu intervālu. Ieteicams kucus attārpot vienlaicīgi ar kucēniem.

Toxocara kontrolei laktējošām kucēm vajadzētu dot 2 nedēļas pēc dzemdībām un ik pēc 2 nedēļām līdz atšķiršanai.

Regulāra vienas devas attārpošana pieaugušiem suņiem jāveic ik pēc 3 mēnešiem. Ja ir spēcīga apaļo tārpu invāzija, tad var atkārtoti attārpot pēc 14 dienām.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc Derīgs līdz/EXP. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Izplatīta lenteņa tipa - *Dipylidium caninum* - starpsaimnieki ir blusas. Lenteņu invāzija pilnīgi noteikti radīsies atkārtoti, ja netiks veikta starpsaimnieku, piemēram, blusu, peļu apkarošana.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Daļēji izlietotas tablets ir jāiznīcina.

Nelietot par 2 nedēļām jaunākiem un/vai suņiem, kuru svars ir mazāks par 2 kg .

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pareizas higiēnas ievērošanas nolūkā personai, kura dod tabletes tieši sunim mutē vai piemaisa barībai, pēc tam jānomazgā rokas.

Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju ārstam.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā:

Pirms grūsnu dzīvnieku ārstēšanas konsultējieties ar veterinārārstu.

Drīkst lietot laktācijas laikā.

Nelietot kucēm grūsnības pirmo divu trimestru laikā.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietojiet vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo var samazināties pīrantela un piperazīna (ir daudzu suņiem paredzētu prettārpu līdzekļu sastāvā) pretparazitārā iedarbība. Vienlaicīga lietošana ar citiem holīnerģiskiem savienojumiem var radīt toksicitāti.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Benzimidazoliem ir augsts drošības līmenis. Pīrantels netiek absorbēts. Prazikvantelam arī ir augsts drošības līmenis, kas līdz 5 reizēm var pārsniegt ieteicamo devu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

12/2015.

15. CITA INFORMĀCIJA

Perforēts Al-Al blisteris: 2 tabletes (1 blisteris ar 2 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 4 tabletes (2 blisteri ar 2 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 10 tabletes (1 blisteris ar 10 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 30 tabletes (3 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 50 tabletes (5 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 100 tabletes (10 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 300 tabletes (30 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA KRKA Latvija

Tel.: 67338610

Fakss: 67338151

Bezrecepšu veterinārās zāles.

100 tablešu iepakojumiem:

Veterinārārsta zīmogs

- Dzīvnieka īpašnieka vārds:

- Dzīvnieka vārds:

- Devas:.....

- Sērija/Lot:

- Derīgs līdz/EXP: